

Gyomirtós gyeprágya

28 + 5 + 12 (+ 2)

Hosszú hatású NPK gyeprágya magnéziummal

Tulajdonságok:

- Kombinált termék: egyszerre valósul meg a gyeprágyázás és a kétszikű gyomok megsemmisítése a sport- és díszgyepekben.
- A levélen és gyökéren keresztül történő hatóanyag felvétel 2-3 héten belül megbízhatóan kiirtja a lóhereféléket és a gyep egyéb jellemző gyomnövényeit.
- Hatásos az összes lóherefélével szemben, valamint útifüvek (Plantago), boglárka (Ranunculus), gyermekláncfű (Taraxacum), tyúkhúr (Stellaria), madárhúr (Cerastium), labodafélék (Atriplex), kamilla (Matricaria), pásztoráska (Capsella bursa-pastoris), sóska (Rumex), százszorszép (Bellis), ínfű (Ajuga) ellen. Veronica-félékkel és kerek repkénnyel (Glechoma) szemben kevésbé, az egyszikű gyomnövényekkel szemben a szer hatóanyaga nem hatásos.
- A fű tápanyagokkal való tartós ellátása miatt az elhalt gyomok helyén keletkező hézagokat a gyep gyorsan benövi.
- A szer alkalmazása méhekre, valamint a hozzájuk tartozó hasznos organizmusokra nem veszélyes.
- A terméknek vízi szervezetekre gyakorolt káros hatása nincs.

Alkalmazása:

- A gyomirtós műtrágyát május és szeptember között, csapadékmentes időben kell kijuttatni, alkalmazása után legalább egy napig ne legyen öntözés. Az alkalmazáskor az éjszakai hőmérséklet ne menjen 10°C alá.
- 2-3 nappal a fű lenyírása után, harmatos vagy esőtől nedves gyepfelületre kell kiszórni. A legjobb hatás akkor érhető el, ha száraz időben 2-3 nappal a műtrágyaszórás után kb. 10 percig locsoljuk.
- Ne alkalmazzuk a vetés évében.
- Használat gyakorisága: normál mennyiségű gyom esetén évente egyszer. Erősen gyomos területen az első kezelés után 5-6 héttel a kijuttatást ismételjük meg.
- Pontos kijuttatása a Rotary ill. dobozos trágyaszórával lehetséges.
- A gyep 3-4 nappal a kezelés után nyírható legközelebb.

Kiszórási mennyiség: 30g/m²

Összetétel:	20 % N	8,5 %	N ammónium formában
		8,7 %	N karbamid formában
		2,8 %	burkolatlan N
	5 % P ₂ O ₅	5 %	foszfát
	8 % K ₂ O	8 %	kálium-dioxid

Hatóanyag:	0,722 %	2,4-D
	0,098 %	Dicamba

Fontos:

Ne tegyük olyan területre, ahol víz érheti, különösen ügyeljünk az esőre vagy az öntözőrendszerre. Minden esetben legalább 5 m-re tegyük vizes helyektől. A kezelés évében a megtámadott területet ne tápláljuk túl. Az eszköz a földigiliszta-népeesség számára enyhén káros hatású. A gyomirtó hatás erősítésére ne alkalmazzuk, ha 12 órán belül csapadék várható. Használatkor vigyázzunk a fölhasználó védelmére. Nem ajánlott használata otthoni- és kiskertekben.